नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी आणि भारत मौसम विभाग
ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com

औरंगाबाद जिल्हा कृषि हवामान सल्ला

मंगळवार, दिनांक - ०९.०७.२०१९

हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक: १०/०७/२०१९ ते १४/०७/२०१९)				
दिनांक	१०/०७	११/०७	१२/०७	१३/०७	१४/०७
पाऊस(मिमी)	०४.०	०४.०	०३.०	०३.०	०२.०
कमाल तापमान (.से.अं)	३१.०	३२.०	३३.०	३३.०	३३.०
किमान तापमान (.से.अं)	२४.०	२४.०	२४.०	२३.०	२३.०
ढग स्थिती	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आद्रता (%)	८१	८०	७९	७६	७७
दुपारची सापेक्ष आद्रता (%)	६४	५९	५७	५४	५५
वाऱ्याचा वेग (तास/किमी)	१५	१५	१५	१६	२०
वाऱ्याची दिशा	नैऋत्य	पश्चिम	नैऋत्य	नैऋत्य	पश्चिम

औरंगाबाद जिल्हयात पुढील पाच दिवसात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकाचे नाव	अवस्था	कृषी सल्ला
कापूस	लागवड	कापूस पिकाची लागवड १५ जुलैपर्यंत करता येते. पेरणीयोग्य पाऊस (७५ मिमी पेक्षा जास्त) झाल्यास बीटी कापूस पिकाच्या कमी कालावधीच्या वाणांची निवड करावी.
तुर	लागवड / पेरणी	पेरणीयोग्य पाऊस (७५ मिमी पेक्षा जास्त) झाल्यास तुरीच्या कमी कालावधीच्या (बीडीएन-७०८, बीडीएन-७११) वाणांची निवड करावी. बियाण्याचे हेक्टरी प्रमाण १२ ते १५ किलो वापरावे व लागवड अंतर ६०× ३० सेमी ठेवावेपेरणीपुर्वी बियाण्यास . किलो/ग्रॅम २५ रायझोबियम, पीएसबी २५ ग्रॅमकिलो/, ट्रायकोडर्मा ४ ग्रॅमकिलो/, थायरम +२ कार्बेन्डॅझिम +१ ग्रॅम किलो/या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावीवेळेवर पेरणी . .केलेल्या पिकास आंतरमशागत म्हणून हलकी डवरणी करावी
मुग / उडीद	पेरणी	शिफारसी नुसार ७ जुलै नंतर सलग मुग व सलग उडीद पिकाची पेरणी करू नये , त्यानंतर करावयची असल्यास .पेरणी केल्याने उत्पनात खूप घट येते कारण उशिरा .आंतरपीक म्हणून त्याचा समावेश करावामुग पिका करीता एकेएम१२१८-, पीकेव्ही एकेएम-४८८०२ -पिकेव्ही ,ग्रीन गोल्ड-पिकेव्ही , आणि उडीद पिकाकरीता एकेयु ,१५- .ब्लॅक गोल्ड -पिडीकेव्ही ,२- टीएयु ,१- टीएयुपेरणीपुर्वी बियाण्यास रायझोबियम २५ ग्रॅमकिलो/, पीएसबी २५ ग्रॅमकिलो/, ट्रायकोडर्मा ४ ग्रॅमकिलो/, थायरम कार्बेन्डॅझिम + +२१ ग्रॅम किलो/या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावीवेळेवर पेरणी क .ेलेल्या पिकास आंतरमशागत म्हणून हलकी डवरणी करावी उडीद या पिकात क्विझालोफॉप ईथाइल . % ५इ (लिटर पाणी १० मिली प्रती २०) .सी.किंवा प्रोपॅक्विझाफोप १०.,इ %सी १५) . (लिटर पाणी १० मिली प्रतीयापैकी एका तणनाशकाची उभ्या पिकात १५दिवसांनी २०- .फवारणी करावी
बाजरी	पेरणी	वेळेवर पेरणी केलेल्या पिकास आंतरमशागत म्हणून हलकी डवरणी करावी.
भुईमूग	पेरणी	पुढील काळात भुईमूग पिकाची पेरणी करू नये. वेळेवर पेरणी केलेल्या पिकास आंतरमशागत म्हणून हलकी डवरणी करावी.
मका	पेरणी	मका पिकावरील लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी बियाण्यास सायएन्ट्रीनिलीप्रोल १९.८० टक्के + थायोमिथॉक्झाम १९.८० टक्के ४ मिली प्रती किलो बियाण्यास बिजप्रक्रीया करावी. वेळेवर पेरणी केलेल्या पिकास आंतरमशागत म्हणून हलकी

		डवरणी करावी.
केळी	वाढीची अवस्था	केळी बागेतील तणांचे नियंत्रण करून आवश्यकता असल्यास बागेस पाणी व्यवस्थापन करावे.
आंबा	वाढीची अवस्था	आंबा फळबागेत ५००: ५००: ५०० ग्रॅम नत्र, स्फुरद, पालाश + ५० किलो शेणखत प्रती झाड खतमात्रा दयावी.
द्राक्ष	वाढीची अवस्था	द्राक्ष बागेत वेलीवरील पानांची संख्या नियंत्रीत करावी. तसेच बागेत रोगनाशकाची फवारणी करावी.
सिताफळ	वाढीची अवस्था	सिताफळ फळबागेत ३००: ३००: ३०० ग्रॅम नत्र, स्फुरद, पालाश + ५० किलो शेणखत प्रती झाड खतमात्रा दयावी.
भाजीपाला	लागवड	वेलवर्गीय भाजीपाला पिकाची लागवड केली नसल्यास लागवड करून पिकास हलके पाणी दयावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावरील रसशोषन किडीचा प्रादुर्भाव दिसुन किडीच्या व्यवस्थापनासाठी डायमिथोएट ३० टक्के २०० मिली प्रती एकर याप्रमाणात फवारणी करावी.
तुती रेशीम उदयोग	--	तुती लागवड जुन ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत हलक्या, मध्यम ते भारी जमिनीत करता येते. तुती बेण्यापासून गादी वाफयावर रोपावाटीका करून तीन महिन्यानंतर रोपे शेतात लावगड करावी. बेणे लागवड करताना ०.२ टक्के बावीस्टीन या बुरशीनाशकाची बेणेप्रक्रीया करूनच लागवड करावी.
पशुधन व्यवस्थापन	--	या महिन्यामध्ये घरगुती माशा व तत्सम प्रकारच्या माशांचा प्रादुर्भाव गोठयामध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो म्हणून ५ टक्के निंबोळी अर्क गोठयामध्ये, परिसरामध्ये व पशुधनाच्या शरीरावर फवारावा.

सदर कृषि हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करण्यात आली असून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यालय मुंबई येथून प्रसारित करण्यात आलेली आहे.