

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प,

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि भारत मौसम विभाग

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com

परभणी कृषी हवामान सल्ला

शुक्रवार दिनांक - ३०.११.२०१९

हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक ३० नोव्हेंबर ते ०४ डिसेंबर, २०१९)					
	दिनांक	३०/११	०१/१२	०२/१२	०३/१२	०४/१२
पाऊस (मिमी)		००.०	००.०	००.०	००.०	०१.०
कमाल तापमान (अं.से.)		३१.०	३१.०	३०.०	३०.०	३०.०
किमान तापमान (अं.से.)		१५.०	१६.०	१६.०	१६.०	१८.०
ढग स्थिती (आकाश)		ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		६७	६७	७४	७४	६९
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		४०	३९	३८	४१	४२
वा-याचा वेग (किमी / तास)		०९	०९	०६	०७	०७
वा-याची दिशा		आग्नेय	आग्नेय	आग्नेय	आग्नेय	आग्नेय
हवामानाचा इशारा	जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात हवामान कोरडे राहून किमान तापमान किंचित घट होण्याची शक्यता आहे.					
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि हवामान सल्ला				
हरभरा	फांदया फुटणे	वेळेवर पेरणी केलेल्या हरभरा पिकास फांदया फुटण्याच्या अवस्थेत पाणी द्यावे.				
गहू	मुकूटमुळे फुटणे	गहू पिकाची पेरणी करून २१ दिवस झाले असल्यास मुकूटमुळे फुटणे या अवस्थेत नत्राचा दुसरा हप्ता ५० किलो नत्र प्रती हेक्टर देऊन पिकास पाणी द्यावे.				
ऊस	लागवड अवस्था	पूर्व हंगामी ऊस पिकाची लागवड केलेल्या पिकात कांदा, पत्ता कोबी, फुलकोबी इत्यादी भाजीपाला पिकांची आंतरपीक म्हणून लागवड करावी.				
हळद	कंद वाढीची अवस्था	हळद पिकावरील कंदमाशीच्या व्यवस्थापनासाठी उघडे पडलेले कंद झाकून घ्यावेत व क्लोरपायरीफॉस ५० टक्के ५०० मिली प्रती एकर याप्रमाणात आळवणी करावी. हळद पिकात पानावरील ठिपके रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी मॅन्कोझेब २५ ग्रॅम किंवा कार्बेन्डॅझिम १० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.				
संत्रा /मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	मृगबहार धरलेली संत्रा / मोसंबी फळबाग सध्या फळवाढीच्या अवस्थेत आहे बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. फळबागेत फळगळ दिसून येत असल्यास एनएए १० पीपीएम ची फवारणी करावी.				
डाळिंब	फळ वाढीची अवस्था	मृगबहार धरलेली डाळिंब फळबाग सध्या फळवाढीच्या अवस्थेत आहे बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी.				
फुल शेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकात तणव्यवस्थापन करून पिकात पाणीव्यवस्थापन करावे.				
भाजीपाला	फळ वाढीची अवस्था	वांगी या भाजीपाला पिकावरील शेंडा व फळपोखरणारी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरॅन्ट्रानिलीप्रोल १८.५ एससी ४ मिली किंवा क्लोरपायरीफॉस २० ईसी २० मिली				

		किंवा सायपरमेथ्रीन १० ईसी ११ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. रब्बी हंगामासाठी लागवड केलेल्या भाजीपाला पिकातील तण व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	लागवड अवस्था	पशुधनास चा-याच्या उपलब्धतेसाठी लसुन घास किंवा मका (आफ्रीकन टॉल) या चारा पिकांची लागवड करावी.

सदर कृषी सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यालय मुंबई येथून प्रसारित करण्यात आलेली आहे.