

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प,

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि भारत मौसम विभाग

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmshparbhani@gmail.com

बीड कृषी हवामान सल्ला

मंगळवार दिनांक - १८.०२.२०२०

हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ फेब्रुवारी, २०२०)					
	दिनांक	१९/०२	२०/०२	२१/०२	२२/०२	२३/०२
पाऊस		००.०	००.०	००.०	००.०	००.०
कमाल तापमान (अं.से.)		३७.०	३६.०	३५.०	३४.०	३४.०
किमान तापमान (अं.से.)		१९.०	२०.०	१९.०	१८.०	१८.०
ढग स्थिती (आकाश)		स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		४२	५१	५६	५३	५०
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		१४	१३	१८	१७	१५
वा-याचा वेग (किमी / तास)		०६	१४	११	१२	११
वा-याची दिशा		पुर्व	दक्षिण	दक्षिण	दक्षिण	दक्षिण
हवामानाचा इशारा	जिल्ह्यात पुढील पाच दिवसात आकाश स्वच्छ राहील					
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि हवामान सल्ला				
कापूस	वेचणी / काढणी अवस्था	नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पेरणी केलेल्या व कापणीस तयार असलेल्या करडईची कापणी करावी. कापणी सकाळी करावी म्हणजे हातांना काटे टोचत नाहीत आणि बोंडातील दाणेही गळत नाहीत; तसेच हातांना काटे टोचू नये म्हणून कपडा किंवा हातमोजे वापरावेत.				
रब्बी ज्वारी	वाढीची अवस्था	वेळेवर पेरणी केलेल्या ज्वारीची काढणी शारिरीक पक्वतेच्या अवस्थेत करावी. या वेळी दाणे टणक होतात व दाण्यातील ओलावा २४ - ३० % असतो. दाण्याच्या खालच्या भागात काळा ठिपका तयार होतो व कणसाचे धांडे पिवळे पडतात. नंतर कणीस ताटापासून वेगळे करून मळणीयंत्राद्वारे ज्वारीची मळणी करावी.				
केळी	वाढीची अवस्था	जून मध्ये लागवड केलेल्या केळीच्या बागेत घडाचे वजनामुळे केळीचे झाड कोलमडूनये म्हणून झाडास आधार द्यावा. केळी बागेस पाणीव्यवस्थापन करावे.				
आंबा	मोहर फुटणे	आंबा फळबागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आंबा फळबागेत खोडकिडीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रादुर्भाव झालेल्या झाडाच्या जुन्या वाळलेल्या फांद्या काढून टाकाव्यात. मुख्य खोडा लगत भुसा दिसून आल्यास तारेच्या आकडयाने आतील आळ्या काढून नष्ट कराव्यात व छिद्रामध्ये पेट्रोलमध्ये बुडविलेला बोळा किंवा क्लोरपायरीफॉस द्रावणाचा (२ मिली प्रति लिटर पाणी) बोळा टाकावा व छिद्र शेणाने अथवा मातीने लिपून घ्यावे.				
द्राक्ष	घड वाढीची अवस्था	काढणीस तयार असलेल्या द्राक्ष घडांची काढणी करून घ्यावी. द्राक्ष बागेत पाणीव्यवस्थापन करावे.				

भाजीपाला	फळवाढीची अवस्था	भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काकडीवर्गीय भाजीपाला पिकात 'गमी स्टेम ब्लॉइट' याचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरोथॅलोनील ७५ % डब्ल्युपी २५ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	मोगरा फुलपिकात पाणीव्यवस्थापन करावे.
पशुधन व्यवस्थापन	--	शेळ्यांच्या / करडांच्या शरीरावर पिसवांचा प्रादुर्भाव झाल्याचे आढळून येत आहे याच्या व्यवस्थापनासाठी शेळ्या व करडांना नियमित गोठ्यापासून काही कालावधी जसे की एक महिना दुर अंतरावर ठेवावे, शेळ्यांचा गोठा स्वच्छ करून भिंतीवरील भेगा, जाळे, जळमटे, इत्यादी स्वच्छ करून ४ टक्के मिठाचे द्रावण फवारावे. तसेच शेळी व करडांच्या शरीरावर वनस्पतीजन्य किटकनाशक (१५ मिली निंबोळी तेल + १५ मिली कारंज तेल + २ ग्रॅम अंगाचा साबण + १ लिटर पाणी) याप्रमाणात द्रावण करून फवारणी करावी.

सदर कृषी सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यालय मुंबई येथून प्रसारित करण्यात आलेली आहे.