

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प,

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि भारत मौसम विभाग

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com

लातूर कृषी हवामान सल्ला

शुक्रवार, दिनांक— १८.०२.२०२१

हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १९ ते २३ फेब्रुवारी , २०२१ )				
दिनांक	१९/०२	२०/०२	२१/०२	२२/०२	२३/०२
पाऊस (मिमी)	५.०	०.०	०.०	०.०	०.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३२.०	३१.०	३२.०	३३.०	३४.०
किमान तापमान (अं.से.)	१६.०	१६.०	१७.०	१७.०	१७.०
ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६५	६२	४५	३८	४०
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	२५	३२	२५	२२	१९
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१३	१०	९	७	८
वा-याची दिशा	पुर्व-इशान्य	इशान्य	पुर्व	पुर्व-आग्नेय	आग्नेय
हवामानाचा इशारा	हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच दिवसात दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हयात काही ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बिड जिल्हयात एक किंवा दोन ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे.				
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि हवामान सल्ला			
गहू	वाढीची अवस्था	ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व काही ठिकाणी झालेल्या पावसामुळे उशिरा पेरणी केलेल्या गहू पिकात तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी झायनेब किंवा मॅन्कोझेब (७५ डब्ल्यूपी) २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. गव्हाच्या पिकात उंदरांचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी झिंक फॉस्फाईड १ भाग + गुळ १ भाग + ५० भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल मिसळून हे मिश्रण उंदरांच्या बिळात टाकून बिळे बंद करावीत.			
हळद	काढणी अवस्था	सध्याच्या काळात वेळेवर लागवड केलेल्या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, पॉलिश करणे ही कामे सुरू आहेत. वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, हळदीची उघडयावर साठवण करू नये.			
आंबा	मोहोर लागणे अवस्था	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, जुन मध्ये लागवड केलेल्या केळीच्या बागेत केळीचे झाड कोलमडु नये म्हणून झाडास आधार दयावा. ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व काही ठिकाणी झालेल्या पावसामुळे मृग बाग लागवड केलेल्या केळी बागेत सिगाटोगा रोगाच्या			

		व्यवस्थापनासाठी प्रोपीकोनाझोल 10 मीली + स्टिकर प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. पाउस, वारा यामुळे बागेत पडलेली फळे गोळा करून नष्ट करावीत.
केळी	घड बाहेर पडणे अवस्था	द्राक्षे बागेत पाणी व्यवस्थापन करावे. द्राक्षे बागेत भुरी रोग व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य ते नियंत्रण करावे.
आंबा	मोहोर ते फळ लागणे अवस्था	ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व काही ठिकाणी झालेल्या पावसामुळे आंबा बागेत भुरी व करपा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनेझॉल पाच मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून वारणी करावी. आंब्यामध्ये मोहोर फुलण्याच्या अवस्थेमध्ये शक्यतो फवारणी टाळावी जेणेकरून परागीकरणावर परिणाम होणार नाही. गरज पडल्यासच तुडतूडयांच्या व्यवस्थापनासाठी 5 % निंबोळी अर्क अथवा थायमिथाक्झाम 25 % दोन ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. पाउस, वारा यामुळे मोडलेल्या फांद्यांची छाटणी करावी.
द्राक्षे	काढणी अवस्था	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या द्राक्षांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी. पाउस, वारा यामुळे द्राक्ष बागेत पडलेले व प्रादुर्भावग्रस्त घड गोळा करून नष्ट करावीत.
संत्रा / मोसंबी	काढणी अवस्था	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या संत्रा/मोसंबी फळांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी. पाउस, वारा यामुळे बागेत पडलेली संत्रा / मोसंबीची फळे गोळा करून नष्ट करावीत. तसेच मोडलेल्या फांद्यांची छाटणी करून त्यावर 1 % बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी. संत्रा / मोसंबी फळ बागेत नागअळीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी इमिडाक्लोप्रीड 17.8 % 3 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सामुदायिक विज्ञान		महिला भगिनींनो लक्षात ठेवा ! मकर संक्रांतीसाठी हळदी कुंकवास जाताना ३ पदरी सुती मुखपट्टीचा वापर अवश्य करा.
डाळींब	फुलोरा अवस्था	पाउस, वारा यामुळे बागेत मोडलेल्या फांद्यांची छाटणी करून त्यावर 1 % बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी.
भाजीपाला	काढणी अवस्था	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यादी पिकांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी. मिरची पिकात भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी मायक्लोब्युटनिल 10% डब्लूपी 10 ग्राम प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. पाउस, वारा यामुळे प्रादुर्भावग्रस्त भाजीपाला गोळा करून नष्ट करावा.
फुल शेती	काढणी अवस्था	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी व प्रतवारी करून, ती बाजारपेठेत विक्रीस पाठवावी.
चारा पिके	साठवण	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणी केलेल्या ज्वारीचा कडबा पावसात भिजणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कारण पावसात भिजल्यास त्याची प्रत खालावून साठवण क्षमता कमी होते व भिजलेला कडबा जनावरे खात नाहीत.
तुती रेशीम उद्योग	--	रेशीम कोषाचा ए-ग्रेड उत्तम प्रकारे मिळवण्यासाठी किटक संगोपन कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक आहे. खाद्य म्हणून तुती पानात पाण्याचे प्रमाण 80 टक्के मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. हलक्या जमिनीत 6 ते 7 दिवसाला तर भारी जमिनीत 10-12 दिवसाच्या

		अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. खत मात्रा; वर्षातून कंपोस्ट खत 2 वेळा जुन व नोव्हेंबर महिन्यात 4 टन प्रत्येकी (एकूण 8 टन एकरी) द्यावे म्हणजे वर्षाकाठी एकरी 25 टन पानाचे उत्पादन मिळते. दुस-या वर्षापासून 250 अंडिपूजाची 5 ते 6 पीके घेणे शक्य होते. 200 कि. ग्रा. कोषाच्या उत्पन्नास रू. 300/- प्रति किलो भाव मिळला तरी 60,000/- प्रमाणे 5 पिकाचे रू. 3 लक्ष उत्पन्न शेतक-याला मिळते.
सामुदायिक विज्ञान	-	कपड्यावर ऑईलपेंट आणि नेलपेंटमुळे पडणारे डाग काढण्यासाठी घरगुती पध्दत. डाग पडलेल्या भागावर केरोसिन, खोबरेलतेल, गोडतेल किंवा पेट्रोल कापसाच्या किंवा स्पंजच्या साहाय्याने लावा. थोडा वेळ ठेवा आणि बोटाने बाहेरून आत चोळा. डाग पसरू द्यायचे नाही. डाग कोरड्या कपड्याने पुसून घ्यावे. कोमट साबणाच्या पाण्याने धुऊन प्रखर उन्हात डाग पडलेला भाग डाग नाहीसा होईपर्यंत ठेवा. तरीही डाग संपूर्णपणे न निघाल्यास लिंबाचा रस आणि मीठ चोळा. 3 ते 5 मिनिट तसेच ठेवा. साबणाच्या पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्या आणि उन्हात ठेवा.
पशुधन व्यवस्थापन	--	वादळी वारा, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व पावसासह तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, जनावरांना उघड्यावर सोडू किंवा बांधू नये. निवा-याच्या ठिकाणी बांधावे व पावसात भिजणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. जनावरांच्या गोठ्याच्या छतावर ऊसाचे पाचट किंवा तुराट्याचे आच्छादन करावे. तसेच पाऊस चालू होण्याच्या वेळी झाडाच्या आडोशाला थांबू नये. जनावरांच्या शरीरावर गारांचा मार लागल्यामुळे जखमा झाल्या असल्यास, जखमांचे स्वरूप पाहून त्या पोटॅशियम परमँगनेटच्या द्रावणाने किंवा आयोडीनच्या द्रावणाने स्वच्छ धुवून, त्यांची मलमपट्टी करावी. गारपीटग्रस्त जनावरांना त्वरीत सकस व प्रोटीन आणि उर्जायुक्त आहार पुरवणे आवश्यक असते. पाण्यातून क्षार, गुळ, मिसळून द्यावा. तसेच ताण प्रतिरोधक औषधी (जसे की स्ट्रेसनेल) आणि रोग प्रतिकार शक्ती वाढविणारी औषधी (इम्यूनोस्टीम्यूलंट्स) पाण्यामधून द्यावीत. नजीकच्या पशुवैद्यकाशी संपर्क साधून पुढील उपचार करावेत जसे की, प्रतिजैवकाची मात्रा व इतर.

सदर कृषी सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यालय मुंबई येथून प्रसारित करण्यात आलेली आहे.