

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प,

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि भारत मौसम विभाग

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com

जालना, कृषी हवामान सल्ला

मंगळवार, दिनांक: ९ मार्च २०२१

हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक १० ते १४ मार्च २०२१)				
	१०/०३	११/०३	१२/०३	१३/०३	१४/०३
दिनांक	१०/०३	११/०३	१२/०३	१३/०३	१४/०३
पाऊस	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३८.०	३८.०	३८.०	३८.०	३८.०
किमान तापमान (अं.से.)	१९.०	१९.०	१८.०	१९.०	१८.०
ढग स्थिती (आकाश)	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	२०	१९	२०	२८	३३
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	१२	११	११	१५	२०
वा-याचा वेग (किमी / तास)	८	९	९	११	७
वा-याची दिशा	नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम- नैऋत्य	ईशान्य	पूर्व
हवामानाचा इशारा	हवामान अंदाजानुसार जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहील				
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि हवामान सल्ला			
हरभरा	काढणी अवस्था	काढणीस तयार असलेल्या हरभरा पिकाची काढणी करावी. हरभ-याच्या परिपक्वतेच्या काळात पाने पिवळी पडतात, घाटे वाळू लागतात. त्यानंतर पिकाची कापणी करावी. अन्यथा पीक जास्त वाळल्यास घाटेगळ होऊन पिकाचे नुकसान होते.			
करडई	काढणी अवस्था	कापणीस तयार असलेल्या करडईची कापणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. कापणी सकाळी करावी म्हणजे हातांना काटे टोचत नाहीत आणि बोंडातील दाणेही गळत नाहीत; तसेच हातांना काटे टोचू नये म्हणून कपडा किंवा हातमोजे वापरावेत.			
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकात उभ्या ऊसाची खालील पक्क तसेच वाळलेली पाने काढून सरीत आच्छादन करावे. उस पिकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी.			
हळद	काढणी अवस्था	काढणीस तयार असलेल्या हळद पिकाची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.			
संत्रा/मोसंबी	फळधारणा अवस्था	लिंबुवर्गीय पिकांत कोळी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी डायकोफॉल १८.५% २ मिली किंवा प्रोपरगाईट २०% १ मिली किंवा इथिऑन २०% २ मिली किंवा विद्राव्य गंधक ३ ग्रॅम प्रती लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. आवश्यकता असल्यास दुसरी फवारणी १५ दिवसांच्या अंतराने करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी.			
डालिंब	फळधारणा अवस्था	डालिंब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी.			
चिकू	फळवाढीची अवस्था	चिकू बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी.			

भाजीपाला	वाढीची अवस्था	टोमॅटो पिकात नाग अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रादुर्भाव ग्रस्त पाने, फळे तोडून नष्ट करावीत. कामगंध सापळे व प्रकाश सापळे यांचा वापर करावा आवश्यकता वाटल्यास सायांट्रिनिलिप्रोले १०.२६% १८ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. फवारणी शक्यतो सकाळी लवकर किंवा दूपार नंतर करावी. उन्हाळी हंगामासाठी लागवड केलेल्या भाजीपाला पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकाची काढणी करावी.
फुल शेती	वाढीची अवस्था	फुल पिकात पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	मका पिकावरील लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ % ४ ग्रॅम किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून वरील किटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. कमाल तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज लक्षात घेता चारा पिकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.
पशुधन	--	पशुधनास मुबलक स्वच्छ पाणी आणि सकस खाद्य उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करावी. पाण्यामधून गुळ अथवा ताण प्रतिरोधक औषधे (योग्य त्या मात्रेमध्ये) द्यावी. पशुधनाचे उष्णतेपासून संरक्षण करावे. पशुधनास दूपारच्या वेळी सावलीत बांधावे.
सामुदायिक विज्ञान	-	शरीरातील सर्व कामे व्यवस्थित करण्याकरिता व आपल्या न्हदयाचे ठोके व्यवस्थित राहण्यासाठी मिठाचीगरज असते. मिठामुळे चव चांगली येते पण मिठाचा वापर कमी करावा. कारण जास्त मिठाचा वापर केल्याने रक्तदाब, न्हदयरोग होतात. जास्त मिठामुळे हाडातील कॅल्शियमचे शोषण होते. जागतिक आरोग्य संघटना यांनी प्रति दिवस ५ ग्रॅम पेक्षा कमी मिठाचा वापर करावा असे सुचविले आहे.

सदर कृषी सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यालय मुंबई येथून प्रसारित करण्यात आलेली आहे.